



กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

MJU CLIPPING 2556/รศ00012

ชื่อหนังสือพิมพ์	วันที่	ปีที่	ฉบับที่	หน้า
ไทยนิวส์	14 มิ.ย. 2556	43	15595	6



การดูแลมะม่วง

หลังการเก็บเกี่ยว

ขนาด 15" x 10 1/2"



ชื่อหนังสือพิมพ์	วันที่	ปีที่	ฉบับที่	หน้า
ไทยนิวส์	14 มิ.ย. 2556	43	15595	6

สีทอง หน้ากลางวัน มหาชนก เขียวสววย โชค
อนันต์ และแรด ส่วนปริมาณการส่งออกของ
มะม่วงแต่ละพันธุ์ขึ้นอยู่กับความต้องการของ
ประเทศนั้นๆ พื้นที่ปลูกมะม่วงในประเทศไทย
ประมาณ 2 ล้านไร่ มีบริษัทส่งออกประมาณ
30 บริษัท (กรมส่งเสริมการเกษตร 2541)
ถึงแม้จะมีพื้นที่ปลูกและปริมาณผลผลิตมาก
แต่มะม่วงที่มีคุณภาพดี ตรงตามมาตรฐานมี
จำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการส่งออก เฉพาะ
ประเทศญี่ปุ่นประเทศเดียวต้องการมะม่วงถึง
1 หมื่นตัน แต่ไทยสามารถส่งได้เพียง 1,500
ตันเท่านั้น

มะม่วงถือได้ว่าเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่
มีความสำคัญในอันดับต้นๆของประเทศไทย
เดิมปลูกไว้เพื่อบริโภคและขายภายในประเทศ
เป็นส่วนใหญ่ แต่ปัจจุบันการปลูกมะม่วงของ
เกษตรกรไทยมุ่งส่งออกไปยังตลาดต่าง
ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์
เวียดนาม เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ แอฟริกา รัสเซีย
จีน สหภาพยุโรป ภายใต้ระบบการผลิตตาม
มาตรฐานการส่งออก พันธุ์มะม่วงที่สามารถ
ส่งออกได้ เช่น น้ำดอกไม้เบอร์ 4 น้ำดอกไม้

อย่างไรก็ตามเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง
จำเป็นจะต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเทคนิค
และวิธีการผลิตมะม่วงให้ได้คุณภาพตรงตาม
มาตรฐานที่แต่ละกลุ่มกำหนดไว้ และจำเป็น
อย่างยิ่งจะต้องรวมกลุ่มกันผลิตมะม่วงเพื่อที่
จะบริหารจัดการด้านการผลิต การควบคุม



โรคแอนแทรกโนส



ชื่อหนังสือพิมพ์	วันที่	ปีที่	ฉบับที่	หน้า
ไทยนิวส์	14 มิ.ย. 2556	43	15595	6

คุณภาพและปริมาณผลผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความปลอดภัยของผู้บริโภคและผู้ผลิต เช่น สารเคมีตกค้างและสารเคมีที่ห้ามใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งจะประสบความสำเร็จในการผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกอย่างมืออาชีพ สามารถยกระดับความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของครอบครัวให้มั่นคง สามารถแข่งขันกับการตลาดภายใต้การค้าเสรีอย่างยั่งยืน และทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยพัฒนาเจริญก้าวหน้าต่อไปได้

มะม่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมและอาจยาวถึงมิถุนายน เพราะมะม่วงเดี่ยวนี้อะไรหรือไม้ผลหลายชนิดทั้งที่เป็นไม้ผลฤดูเดียว ยังออกผลหลายรุ่นเหมือนไม้ผลทวาย เนื่องจากสภาวะอากาศแปรปรวนและค่อนข้างวิกฤตเมื่อได้น้ำหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงเริ่มแตกใบอ่อน ก็จะมีทั้งโรคและแมลงเข้าทำลายมะม่วง

ช่วงแตกใบอ่อน โรคที่เป็นพระเอกและเป็นโรคที่สำคัญที่สุดของมะม่วงคือโรคแอนแทรคโนส ส่วนแมลงที่สำคัญก็คือ หนอนกินใบมะม่วง ตัวงักกินใบอ่อนมะม่วง ตัวงวงกัดใบมะม่วง ตัวงวงกรีดใบมะม่วง และหนอนเจาะยอดมะม่วง การป้องกันกำจัดแมลงมะม่วงช่วงแตกใบอ่อน

1. หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ควรตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง ตัดกิ่งที่พบโรคและแมลงออกนำไปเผาทำลาย

2. ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก และปุ๋ยเคมี สูตร 25-7-7

3. ฉีดพ่นสมุนไพร หรือน้ำส้มควันไม้ (น้ำส้มควันไม้ควรเป็นน้ำส้มควันไม้ที่ตกตะกอนแล้ว) โดยอัตราส่วนน้ำส้มควันไม้ 1 ส่วนต่อน้ำ 150-200 ส่วนหรือ 150-200 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

4. ฉีดพ่นด้วยคาร์บาริล (เซฟวิน 85%



แมลงกัดกินใบอ่อนมะม่วง



ชื่อหนังสือพิมพ์	วันที่	ปีที่	ฉบับที่	หน้า
ไทยนิวส์	14 มิ.ย. 2556	43	15595	6



น้ำส้มคว้นไม้

wp) อัตรา 60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ
คาร์โบซิลแฟน (พอสซ์ 20% CC) อัตรา 40
มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร เพื่อป้องกันและขับ
ไล่แมลง

สำหรับโรคของมะม่วงช่วงแตกใบ
อ่อนในฤดูฝน หรือในพื้นที่ที่ขึ้นและ คือ โรค
แอนแทรกโนส เป็นโรคที่มีความสำคัญที่สุดหรือ
เป็นพระเอกของโรคมะม่วง เกิดจากเชื้อราเข้า
ทำลายใบอ่อน ช่อดอก และผลมะม่วง สำหรับ
ใบอ่อนที่แตกออกมาใหม่จะพบจุดสีน้ำตาลเข้ม
ขนาดเล็กจำนวนมาก ใบอ่อนมีอาการบิดงอ
จนถึงใบไหม้ ทำให้ยอดแห้งไม่สามารถเจริญเติบโต
พัฒนาเป็นใบแก่และแตกยอดใหม่ต่อไปได้

การป้องกันกำจัด

1.หลังจากเก็บเกี่ยวผลมะม่วงแล้ว
ควรตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง ลมพัดผ่านได้สะดวก

ตัดกิ่งที่เป็นโรคและแมลงนำไปเผาทำลาย
2.ตัดหญ้าภายในสวน อย่าให้หญ้า
ขึ้นรกหนาแน่น เป็นที่อยู่ของโรคและแมลง

3.ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยเคมี
สูตร 25-7-7

4.ฉีดพ่นสมุนไพร หรือน้ำส้มคว้นไม้
หรือฉีดพ่นสารเคมีกำจัดเชื้อรา แคลแทนหรือ
แมนโคเซป หรือคอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์
ผสมสารจับใบเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนชะล้างสาร
เคมี

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์พิชัย สมบูรณ์วงศ์ นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการ
เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร.0-5387-3938-
9 ในวันและเวลาราชการ.