



ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้

MAEJO UNIVERSITY NEWSRELEASE

00666



งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร.0-5387-3046-7



ประจำวันที่ 10เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕8

แนะห่อผลกล้วยเพื่อห้สัพอเป็นสัพอ

แนะเกษตรกรชาวสวนกล้วย ห่อสัพอ เพื่อให้สัพอกล้วยมีลักษณะเป็นสีทองสวย ทำให้ลั้วยมีราคาสูงและเป็นที่ต้องการของตลาด เผยวิธีการห่อทำได้งายราคาถูก โดยใช้ห้หังสัพอพิมพ์ 2 ซัฮ์ห่อสัพอผลลั้วยนาน 5-7 สัปดาห์

ดร.ธีระนุช เจริญกิจ คณะผลิตกรรม การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้วิจัยเรื่อง เผยพัฒนาคุณภาพผลผลิตลั้วยโดยการห่อสัพอผล เผยว่า โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวเริ่มต้น

จากการสังเกตที่ว่ลั้วยที่ติดผลภายในทรงพุ่มจะมีสีผิวสวยงามกว่าลั้วยที่ติดผลนอกทรงพุ่ม คิดว่าการห่อสัพอผลลั้วยซึ่งเป็นวิธีการพรางแสงระดับหังจะสามารถทำให้ลั้วยมีสีผิวที่ดีขึ้นได้ จึงได้ทำการศึกษาอิทธิพลของด้าแหงซ้อในทรงพุ่มต่อการบังเงาและการเกิดสีผิวผลลั้วย พร้อมทั้งศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการห่อสัพอผลลั้วย

จากผลการศึกษาพบว่า วัสดุที่บแแสง เช่น ถึงกระดาษสีน้ำตาล หรือกระดาษหังสัพอพิมพ์ เหมาะสมลั้วยใช้ห่อสัพอลั้วย โดยกระดาษหังสัพอพิมพ์ที่ห่อด้วยความหนา 2 ซัฮ์ จะเหมาะสมที่สุด ในแง่ของค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าและหาได้ง่าย ในหังถิ่น โดยมีวิธีการห่อคือ ก่อนการห่อผลลั้วยทุกครั้ง ควรทำการฉีดพ่นยาป้องกันกำจัดศัตรูพืช ก่อน เนื่องจากการห่อสัพอผลจะทำให้ความชื้นในห่อสูงกว่าซ้างนอก ซึ่งความชื้นสูงซ้างนอก ซึ่งความชื้นสูงดังกล่าวมัสภาพที่เหมาะสมลั้วยสำหรับการเข้าทำลายของโรคและแมลง ถ้าซ้อที่ซัฮ์ด้านบนอาจต้องทำการรวมซากระดาษแล้วใช้ที่เย็บกระดาษเย็บปิดเพื่อป้องกันแสงแดดส่องผ่าน โดยระยะเวลาที่เหมาะสมในการห่อเพื่อให้ได้ลั้วยสีผิวตามความต้องการคือประมาณ 5-7 สัปดาห์ หรือเมื่อเริ่มห่อขนาดผลลั้วยมีความกว้างประมาณ 1.5-2 เซนติเมตร และมีน้ำหนักห่อประมาณ 4-5 กรัม ต่อผล ค่าความสว่างของสีผิวจึงจะเปลี่ยนแปลงให้เห็นอย่างชัดเจน

ดร.ธีระนุช กล่าวเพิ่มเติมว่า การห่อซ้อผลลั้วยทำให้ลั้วยมีสีผิวสวยงามกว่าที่ไม่ได้ห่ออย่างชัดเจน แต่ถ้ลั้วยห่อแล้วเจอฝนไม่ได้ทำการฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดแมลงเป็นอย่ยดังก่่อนการห่อ มัจะประสบปัญหาเรื่องผลแตก หรือการเข้าทำลายของเพลี้ยและเชื้อราตามมา การแก้ปัญหาก็เหมาะสมในเรืองแมลงศัตรูพืชคือ การฉีดพ่นยาก่อนการห่อ ส่วนเรื่องการห่อในช่วงฤดูฝนที่ฝนตกหนักติดต่อกัน ควรเปิดห่อปล่อยซ้อให้ลม