



กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

MJU CLIPPING 2553/

ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยนิวส์	วันที่ ๒๒ ๓.ค. 2552	ปีที่ 40	ฉบับที่ 14245	หน้า 6
-------------------------------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------	------------------

โรคข้าวและแมลง

ศัตรูข้าวที่เราพบ

ไม่ควรมองข้าม

ข้าวอย่างสม่ำเสมอ ถ้าต้นข้าวในนาไม่เขียว
แสดงอาการเหลืองควรให้น้ำปุ๋ยเร่งสูตร 46-
0-0 อัตรา 10-15 กก.ต่อไร่ โรคที่
สำคัญคือ

โรคยอดฟกดาบ หรือชาวนาทั่วไป
เรียกโรคหลาว สาเหตุ เกิดจากเชื้อราฟิว
ซาเรียม อาการ พบโรคในระยะกล้า ต้นกล้า
จะแห้งตายหลังจากปลูกได้ไม่เกิน 7 วัน แต่
มักพบกับข้าวอายุเกิน 15 วัน ข้าวเป็นโรค
จะผอมสูงเด่นกว่ากล้าข้าวโดยทั่ว ๆ ไป ต้น
ข้าวผอมมีสีเขียวอ่อนชืดมักย่างปล้อง บาง
กรณีข้าวจะไม่ย่างปล้อง แต่รากจะเน่าข้าว
เวลาถอนมักจะขาดตรงบริเวณโคนต้น ถ้า
เป็นรุนแรงกล้าข้าวจะตาย หากไม่รุนแรง
อาการจะแสดงหลังจากย้ายไปปักดำ 15-45
วัน โดยที่ต้นเป็นโรคจะสูงกว่าข้าวปกติ ใบมี
สีเขียวชืด เกิดจากรากแขนงที่ขอลำต้นตรง
ระดับน้ำ บางครั้งพบกลุ่มเส้นใยสีชมพูตรง
บริเวณข้อที่ย่างปล้องขึ้นมา ต้นข้าวที่เป็นโรค
มักจะตายและมีน้อยมากที่อยู่รอดจนถึง



กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

MJU CLIPPING 2553/

ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยนิวส์	วันที่ 2 ต.ค. 2552	ปีที่ 40	ฉบับที่ 14245	หน้า 6
-------------------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------	------------------

เชื้อต่อนข้าวอายุแก่ (ระยะตั้งท้อง-ออกรวง) ข้าวเริ่มแสดงอาการตั้งแต่อายุ 15-20 วัน ทั้งนี้ แล้วแต่ว่าข้าวจะได้รับเชื้อระยะใด อาการเริ่มต้น ใบข้าวจะเริ่มมีสีเหลืองสลับเขียว ต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง เริ่มจากปลายใบเข้าหาโคนใบ ถ้าเป็นรุนแรงในระยะกล้าต้นข้าว

ถึงระยะออกรวง ให้รวงเล็ก หรือไม่ออกรวงเลย และออกรวงล่าช้ากว่าปกติ การแพร่ระบาด มีเพลี้ยจักจั่นสีเขียว เป็นแมลงพาหะนำโรค

การป้องกันกำจัด ใช้พันธุ์ข้าวต้านทานแมลงเพลี้ยจักจั่นสีเขียว เช่น กข 1 กข





กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

MJU CLIPPING 2553/

ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยนิวส์	วันที่ ๕.๒ ต.ค. 2552	ปีที่ 40	ฉบับที่ 14245	หน้า 6
-------------------------------------	--------------------------------	--------------------	-------------------------	------------------

ออกรวง

การแพร่ระบาด เชื้อราจะติดไปกับเมล็ด สามารถมีชีวิตในซากต้นข้าว และในดินได้เป็นเวลาหลายเดือน พบว่า หญ้าชันกาด เป็นพืชอาศัยของโรค

การป้องกันกำจัด หลีกเลี่ยงการ

นำเมล็ดพันธุ์จากแหล่งที่เคยเป็นโรคระบาดมาปลูกปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น เบนเลท-ดี ไดเทนเอ็ม 45 อัตรา และการปฏิบัติตาม คำแนะนำของนักวิชาการควรกำจัดต้นข้าวที่เป็นโรคโดยการถอนและเผาไฟเสีย เมื่อเกี่ยวข้าวแล้วควรไถน้ำเข้าที่





กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

MJU CLIPPING 2553/

ชื่อหนังสือพิมพ์	วันที่	ปีที่	ฉบับที่	หน้า
ไทยนิวส์	๕ 2 ต.ค. 2552	40	14245	6

หรือ มีปซิน หรือสารป้องกันประเภทฉีดพ่น
เช่น เซพวิน 85 มีปซิน หรือสารออกฤทธิ์
ป้องกันกำจัดเพลี้ยจักจั่นสีเขียวอื่น ๆ ตาม
คำแนะนำของนักวิชาการ ตามอัตราและระยะ
เวลาใช้ที่เหมาะสม

เกษตรกรชาวนาต้องรีบไปขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวด่วน ภายในสิ้น
เดือนกันยายน 2552 นี้เท่านั้น ถ้าหาก
ท่านต้องการเข้าร่วมโครงการประกันราคาข้าว
ของรัฐบาล ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่ม
เติมที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน

ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โทร.0-5387-3938-9

เรียบเรียง

3.แปลงข้าวที่เป็นโรคยอดฝักดาบ หรือ
โรคหาลาว เกิดจากเชื้อราฟิวซาเรียม.

4.แปลงข้าวที่เป็นโรคใบสีส้ม เกิดจาก
เชื้อไวรัส.