



กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น

00014

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

MJU CLIPPING 2556/

ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยนิวส์	วันที่ 28 ธ.ค. 2555	ปีที่ 43	ฉบับที่ 15427	หน้า 6
-------------------------------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------	------------------




การผลิตลำไยในฤดู

และนอกฤดู



ชื่อหนังสือพิมพ์	วันที่	ปีที่	ฉบับที่	หน้า
ไทยนิวส์	28 ธ.ค. 2555	43	15427	6



การตัดข้อผล

มีนาคม สร้างเมล็ดและเปลือก ตัดข้อผล โดยตัดปลายข้อผลเหลือไว้ไม่เกิน 60 ผลต่อข้อ ระยะเวลาผลเท่าเมล็ดถั่วเขียว ให้ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอเช่น 15-15-15 หรือ 16-16-16 แบ่งใส่เดือนละครั้ง แล้วให้น้ำตามทุกครั้ง และให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ ดูแลโรคและแมลงให้ฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้ อัตราน้ำส้มควันไม้ 1 ส่วน ต่อน้ำ 150 ส่วน (น้ำส้มควันไม้ 150 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร) หรือ ฉีดพ่นสารเคมีคลอไพริฟอส 50% + ไซเปอร์เมทริน อัตรา 20-30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมสารเคมีป้องกันเชื้อรา

เมษายนและพฤษภาคม เมล็ดเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ระยะสร้างเนื้อ ให้ปุ๋ยเคมีตามการคาดคะเนปริมาณผลผลิต ตามตารางแสดงปริมาณปุ๋ยที่ควรให้แก่ลำไยในระยะติดผลถึงเก็บเกี่ยว (ในคู่มือการผลิตลำไยคุณภาพ) หรือให้ปุ๋ยสูตรตัวท้ายสูง เช่น 13-13-21 หรือ 8-24-24 ให้น้ำตามและให้น้ำสม่ำเสมอ ดูแลโรคและแมลง มิถุนายน สร้างเนื้อและขยายผลเร็วให้ปุ๋ยเคมีตามการคาดคะเนปริมาณผลผลิต ตามตารางที่ 5.2 แสดงปริมาณปุ๋ยที่ควรให้แก่ลำไยในระยะติดผลถึงเก็บเกี่ยว (ในคู่มือการผลิตลำไยคุณภาพ) หรือให้ปุ๋ยสูตรตัวท้ายสูงเช่น 13-13-21 หรือ 8-24-24 ให้น้ำสม่ำเสมอ

ดูแลโรคและแมลง เช่น เพลี้ยหอยหลังเต่า มวลลำไย ผีเสื้อมวนหวาน โรคผลลาย ผลแตก ผลร่วงให้ฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้ อัตราน้ำส้มควันไม้ 1 ส่วน ต่อน้ำ 150 ส่วน (น้ำส้มควันไม้ 150 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร) หรือ ฉีดพ่นสารเคมีคลอไพริฟอส 50% + ไซเปอร์เมทริน อัตรา 20 - 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมสารเคมีป้องกันเชื้อรา ทีบูโคนาโซล 25%EW กรกฎาคม เก็บเกี่ยวผลผลิต (อ่านต่อฉบับวันที่ 4 มกราคม 2556)

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์พิชัย สมบูรณ์วงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร.0-5387-3938-9 ในวันและเวลาราชการ.

อาจารย์พิชัย สมบูรณ์วงศ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

และสมศักดิ์ ศรี นักวิชาการเกษตร

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี

ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โทร.0-5387-3938-9



ชื่อหนังสือพิมพ์	วันที่	ปีที่	ฉบับที่	หน้า
ไทยนิวส์	28 ธ.ค. 2555	43	15427	6

ลำไยเป็นไม้ผลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน เนื่องจากลำไยสามารถชักนำการออกดอกได้ง่าย มีสารเคมีหลายชนิดที่สามารถกระตุ้นให้ลำไยออกดอกได้ ลำไยเป็นไม้ผลที่ไม่จำเป็นต้องห่อผล เพียงแต่ต้องมีการตัดข้อผลบ้างเมื่อลำไยติดผลต่อช่อมาก ลำไยนอกจากจำหน่ายในรูปแบบผลสดแล้ว ยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นลำไยกระป๋อง ลำไยอบแห้งทั้งเปลือกและเฉพาะเนื้อสีทอง ในปี 2558 ประเทศไทยจะต้องเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เกษตรกรผู้ปลูกลำไยและผู้ประกอบการจะต้องผลิตลำไยให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามที่ตลาด

ก็เพื่อที่จะนำเอาเนื้อหาทั้งหนังสือการผลิตลำไย ประสิทธิภาพ และผู้ประสบความสำเร็จในการผลิตลำไย นำมาสรุปให้ได้เนื้อหาสาระกระชับ และง่ายต่อการนำไปเป็นแนวทางการผลิตลำไยให้ได้คุณภาพ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อท่านได้อ่านแล้วจะเข้าใจและนำไปปฏิบัติลำไยให้ได้คุณภาพ และประสบความสำเร็จในการผลิตลำไย จนสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว พัฒนาชุมชนและประเทศชาติต่อไป

การดูแลลำไยในฤดู สิงหาคม ตัดแต่งกิ่ง เอากิ่งไปทำฟืน เผาถ่าน เอาใบคลุมในทรงพุ่ม (ให้เสร็จไม่เกิน 30 วัน)

กันยายน แรกใบอ่อนครั้งที่ 1 เอา



การตัดแต่งกิ่ง



กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

00014
MJU CLIPPING 2556/

ชื่อหนังสือพิมพ์	วันที่	ปีที่	ฉบับที่	หน้า
ไทยนิวส์	28 ธ.ค. 2555	43	15427	6

ทอง การป้องกันกำจัด ให้ฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้ อัตราน้ำส้มควันไม้ 1 ส่วน ต่อน้ำ 150 ส่วน(น้ำ ส้มควันไม้ 150 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร) หรือ ฉีด พ่นสารเคมีคลอไพริฟอส 50% + ไซเปอร์เมท ริน อัตรา 20 - 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

ตุลาคม แดกใบอ่อนครั้งที่ 2 ให้ปุ๋ย เคมี สูตร 46 - 0 - 0 หรือ 25 -7-7 (อัตรา ตามปริมาณปุ๋ยด้านหลัง) ให้น้ำตามระว่างหนอน และแมลงกัดกินใบอ่อน เช่น หนอนคืบกินใบ หนอนม้งกร หนอนหนาม ตัวงกินใบ ตัวง กุหลาบ แมลงค่อมทอง การป้องกันกำจัด ให้ ฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้ อัตราน้ำส้มควันไม้ 1 ส่วน ต่อน้ำ 150 ส่วน(น้ำส้มควันไม้ 150 ซีซี ต่อ น้ำ 20 ลิตร) หรือ ฉีดพ่นสารเคมีคลอไพริฟอส 50% + ไซเปอร์เมทริน อัตรา 20-30 ซีซี ต่อ น้ำ 20 ลิตร

พฤศจิกายน แดกใบอ่อนครั้งที่ 3 ให้ ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0 หรือ 25 -7-7 (อัตรา ตามปริมาณปุ๋ยด้านหลัง) ให้น้ำตามระว่างหนอน และแมลงกัดกินใบอ่อน เช่น หนอนคืบกินใบ หนอนม้งกร หนอนหนาม ตัวงกินใบ ตัวง กุหลาบ แมลงค่อมทอง การป้องกันกำจัด ให้ ฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้ อัตราน้ำส้มควันไม้ 1 ส่วน ต่อน้ำ 150 ส่วน(น้ำส้มควันไม้ 150 ซีซี ต่อ น้ำ 20 ลิตร) หรือ ฉีดพ่นสารเคมีคลอไพริฟอส 50% + ไซเปอร์เมทริน อัตรา 20 - 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

ธันวาคม ชักนำการออกดอก กระตุ้น

รอบทรงพุ่ม(ให้สารในตอนเช้า)) หลังจากให้ สาร 7 10 วัน ให้ฉีดพ่นทางใบ สาร 3 ซัด ผสมกับปุ๋ยสูตร 0 - 52 - 34 อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร (ให้ฉีดพ่นตอนเย็น) แสง วันที่ให้สารควรมีแสงแดดจัด ความบริสุทธิ์ของ สาร 99.7เปอร์เซ็นต์(วิเคราะห์สารที่แม่โจ้ 100 บาท)

มกราคม ออกดอก ดูแลน้ำให้สม่ำเสมอ ไม่ต้องมาก ดูแลโรคและแมลง ให้ฉีด พ่นน้ำส้มควันไม้ อัตราน้ำส้มควันไม้ 1 ส่วน ต่อน้ำ 150 ส่วน(น้ำส้มควันไม้ 150 ซีซี ต่อ น้ำ 20 ลิตร) หรือ ฉีดพ่นสารเคมีคลอไพริฟอส 50% + ไซเปอร์เมทริน อัตรา 20 - 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร หลังจากแทงช่อดอก (ดอก ยังไม่บาน)

กุมภาพันธ์ ติดผล ขนาดเท่าหัวไม้ขีด ไฟให้ปุ๋ยเคมีตามการคาดคะเนปริมาณผลผลิต ตามตาราง แสดงปริมาณปุ๋ยที่ควรให้แก่ลำไยใน ระยะติดผลถึงเก็บเกี่ยว(ในคู่มือการผลิตลำไย คุณภาพ) หรือให้ปุ๋ยสูตรตัวหน้าสูงเช่น 46- 0- 0 หรือ 25-7-7 แบ่งใส่เดือนละครั้ง (2 ครั้ง)ให้ น้ำตามทุกครั้งและให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ ดูแล โรคและแมลง ให้ฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้ อัตราน้ำ ส้มควันไม้ 1 ส่วน ต่อน้ำ 150 ส่วน(น้ำส้ม ควันไม้ 150 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร) หรือ ฉีดพ่น สารเคมีคลอไพริฟอส50% + ไซเปอร์เมทริน อัตรา 20 - 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมสาร เคมีป้องกันเชื้อรา คาร์เบนดาซิม