



ข่าวประชาสัมพันธ์ MAEJO UNIVERSITY NEWSRELEASE



งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร.0-5387-3046-7

www.mju.ac.th/prmacjo



ประจำปี 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2551

โรคหัดระบาดเด็กแม่โจ้นับร้อย ระบาดทั่วชุมชนป้องกันตัวกับครื่องหัด

■ ระบาดโรคเด็กแม่โจ้นับร้อย
ข้ามจังหวัดวิทยาเขตแม่โจ้เป็นด้วย
สาธารณสุข 2 จังหวัดระดมฉีดวัคซีน
ศึกษาเรื่องหนึ่งป้องกันโรคหัด
กิจกรรมกลุ่มชั่วคราว แม่โจ้เป็นหัดที่เกิด
ขึ้นกับเด็กที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนตัว
ตระหนักแม่โจ้คนนอกเริ่มเป็น ขอบเขต
ตัวให้ถูกเพื่อแม่โจ้แม่โจ้สู่ชุมชน

เกิดเหตุนี้ศึกษาใหม่ปี 1

มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตแม่โจ้
อาคารศูนย์แม่โจ้แม่โจ้แม่โจ้แม่โจ้
และกินอาหารแม่โจ้แม่โจ้แม่โจ้แม่โจ้
ตั้งกลางเดือนพฤษภาคม และเป็นที่
งานที่เกิดจากการรวมกลุ่มกิจกรรม
น้องใหม่

นายอุดม พรหมมณีย์ ผู้อำนวยการ

การกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ เชียงใหม่กล่าวว่าได้ประสานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจสอบแล้วพบว่า
อาการของโรคที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาที่
นั้น คล้ายกับโรคหัด จึงได้ทำการรักษาโดย
ส่งนักศึกษาที่มีอาการไปรักษาด้วย
พยาบาลอาสาสมัครแม่โจ้แม่โจ้แม่โจ้
อ.สันกำแพง อ.ดอยสะเก็ด และ
รพ.นครพิงค์ ส่วนนักศึกษาใหม่ที่มีทั้งหมด
รวม 4,600 คน ที่พักอยู่ในหอพักภายใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้แม่โจ้แม่โจ้แม่โจ้
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดให้แล้วครึ่งหนึ่ง คือ
ราว 1,100 คน ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างติดตาม
สถานการณ์ หากยังคงพบว่ามีการระบาดอยู่
ก็จะฉีดวัคซีนเพิ่มให้กับนักศึกษา
ที่เหลือเพิ่มเติม

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้แจ้งกิจกรรม
ที่ต้องรวมกลุ่มใหญ่ไปก่อน 2 สัปดาห์
จากโรคหัดจะติดต่อทางลมหายใจได้
ส่วนการเรียนการสอนยังเปิดตามปกติ แต่
นักศึกษาบางส่วนที่ขาดเรียนเพื่อพักรักษาตัว
สามารถติดตามการเรียนการสอนได้
ถึง

ขณะที่มีรายงานจากจังหวัดแพร่ว่า
นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้แม่โจ้
พระภิกษุวิฑูรย์เขตแม่โจ้แม่โจ้แม่โจ้
ระบด ต้องนำส่งโรงพยาบาลจำนวน 21 ราย
และสาธารณสุขจังหวัดแพร่จังหวัดแม่โจ้
วัดขึ้นป้องกันหัดให้นักศึกษาว่า 2,000
คนเพื่อไม่ให้เกิดระบาดในชุมชน

ด้าน ทันตแพทย์สุรสิงห์
วิสูตรรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดแม่โจ้แม่โจ้แม่โจ้แม่โจ้แม่โจ้

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด แต่ไม่ได้
รับการกระตุ้นแม่โจ้แม่โจ้แม่โจ้แม่โจ้
ที่แม่โจ้ได้ฉีดแล้วจะเป็นโรคหัดจึงเกิด
ขึ้นได้ โดยขณะนี้ศึกษาที่แสดงอาการทั้ง
สิ้น 123 คน จำนวนหนึ่งพบระยะแรก
ไปแล้ว และรักษาตามอาการ แต่จำนวน
หนึ่งยังต้องเฝ้าระวังการป้องกันโรค
ผู้อื่น

ส่วนนักศึกษาปี 1 ที่ไม่แสดงอาการ
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ฉีดวัคซีนให้
แล้ว 1,000 คน แต่ที่เหลืออีกราว 3,600
คน กำลังประสานกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ได้รับวัคซีนให้เต็มตามที่ส่งไปป้องกันโรค
แม่โจ้แม่โจ้แม่โจ้แม่โจ้แม่โจ้แม่โจ้
กับมหาวิทยาลัยในการลดกิจกรรมรวมกลุ่ม
ใกล้ชิดกันหรืออยู่ในระยะนี้ไป
ก่อนด้วย

ขณะที่บุคลากรภายนอกที่เกิดอาการ
ของโรคหัดเช่นกัน 1 รายนั้น ตรวจลบ
แล้วพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับ

นักศึกษา ดังนั้นจึงต้องเข้มงวดกับนักศึกษา
ที่กลับบ้านหรืออาทิตย์ อาการที่ไม่ชัดเจน ให้
ดูแลตัวเองไม่ให้แพร่เชื้อ โดยหากมีอาการ
ที่เป็นหัด ให้รีบพบแพทย์ โดยหากมีขึ้น
ในระยะ 4-5 วันถือว่าพ้นระยะแพร่เชื้อแล้ว
แต่หากผู้ที่เป็นในช่วงนี้ใช้ในกลุ่มที่อยู่
ระหว่างแพร่เชื้อก็ต้องระมัดระวังปฏิบัติตัว
ให้ถูกต้อง

"ทีมเราจะฉีดวัคซีนป้องกันหัดใน
ตอนเล็ก และไม่ต้องฉีดอีกเลย แต่ยุคใหม่
จะมีตารางให้วัคซีนช้าใหม่เมื่ออายุ 12 ปี
ดังนั้นเด็กใหม่จะมีอาการต้องฉีดกระตุ้น
วัคซีนหัดตอน 1 ปี แต่ตอนนี้อายุ 18-19
ปีในปัจจุบันเป็นกลุ่มที่ไม่ได้กระตุ้นเพิ่ม
ทำให้กลุ่มนี้กลายพันธุ์จนเกิดระบาดขึ้น
ได้ ไม่ใช่ว่าแม่โจ้ เพราะเคยเกิดเหตุการณ์
เช่นนี้ถึง 3 ครั้งแล้วครั้งนั้น นาน เขียวราย
ในกลุ่มอายุนี้และอยู่รวมกันเช่นนักเรียน
เทคนิค ทหารเกณฑ์เป็นต้น" รองนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าว

วิจัยพบยุงเห็บก่อพยาธิ หวั่นใช้เลือดออกโรคระบาดหนัก

■ ศึกษาย ย. พยงคยาดีดีดีดี 100% และยุงกัดต่อสารเคมีอื่นๆ สูงขึ้น
ผลให้การกำจัดและควบคุมประชากรยุงโดยใช้สารเคมีฆ่าแมลงได้ผลไม่เต็มที่
ใช้เลือดออกและสารเคมีฆ่าแมลง

ดร.ละอียด ประพันธ์ธรา นักวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับการสำรวจพื้นที่ในภาคเหนือ เพื่อวิจัยการดื้อยา
และยุงกัด โดยการศึกษาการดื้อยาต่อสารเคมีดีดีดีดี และกลุ่มไพรีทรอยด์ และ
สารเคมีที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันซึ่งเป็นสารเคมีกลุ่มที่ใช้มากในประเทศไทย ทั้งแบบพ่น
ของสารเคมีต่างๆ และยาฆ่าแมลงในบ้านเรือนและพบว่ายุงดื้อยาต่อการฉีด
สารเคมีดีดีดีดีเกือบ 100% และยุงกัดต่อสารเคมีอื่นๆ ในกลุ่มไพรีทรอยด์ด้วย การ
ดื้อต่อสารเคมีฆ่าแมลงในยุงพาหะมีอัตราสูงขึ้น จะส่งผลให้การกำจัดและควบคุม
ยุงประชากรยุงโดยใช้สารเคมีฆ่าแมลงได้ผลไม่เต็มที่ หรืออาจล้มเหลวในการควบคุม
ยุงโรคติดต่อ เช่น มาลาเรีย และไข้เลือดออก

ดร.ละอียดกล่าวว่า การควบคุมยุงในประเทศไทยได้มีการใช้สารเคมีฉีด
พ่นมานานกว่า 50 ปี โดยไม่มีการควบคุมติดต่อกันมานาน เป็นสาเหตุให้ยุงพัฒนา
ตัวเองจนสามารถต้านทานยาฆ่าแมลงได้เหมือนคนดื้อยา การดื้อยาในแมลงต่างๆ
เป็นพัฒนาการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หากแมลงดื้อยาฆ่าแมลงเพียงเล็กน้อยใน
ครั้งแรก จะไม่ตาย และสร้างภูมิคุ้มกันจน จนกลายเป็นการดื้อยาฆ่าแมลงชนิดนั้น
และสามารถถ่ายทอดการดื้อยนั้น ให้กับลูกหลานที่แพร่พันธุ์ออกไปด้วย ซึ่งการที่คนใช้
ยาฆ่าแมลงชนิดแรงขึ้นเรื่อยๆ นั้น จะทำให้ยุง แมลง เกิดการดื้อยามากขึ้นด้วย
นอกจากนี้ ในส่วนของยุงพาหะยุงที่ใช้กินอยู่ทั่วไปอาจจะไม่ได้ผล 100 % ตามที่
โฆษณา ปัจจุบันมีการใช้ยาเป็นส่วนใหญ่ แต่ในขณะเดียวกันสารเคมีอื่นๆ ที่เป็น