

หน้าปก
เทคโนโลยี
2
วิชา
 ■ ปากีสถาน
 ■ ปากีสถาน

หน้า 1: เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2551.

เทคโนโลยีการประมง

จาก

ผลลัพธ์นี้ในการเพาะผสม
และ F2 ที่เลี้ยงในเมดิเตอร์เรเนียนรายแรกของ
โลกไปแล้ว เมื่อปี 2549 รศ.ดร.เกวียศักดิ์
แห่งอัมพัน คณบดีคณะเทคโนโลยีการ
ประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ได้ต่อยอดผลงานและเผยแพร่ไปสู่
เกษตรกร เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตลาดโลกเชิงพาณิชย์ ให้มีสินค้า
เนื้อเรียวสูงถึงได้อย่างสอดคล้องกับนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรฯ และกรมประมง
อย่างไร้

● 5. อย่งไร

รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ กล่าวว่า "โลกนี้" เป็นโลกที่ไม่มีสิ่งเกิดขึ้นขนาดใหญ่มากที่สุดในโลก มันอยู่ต่ำกว่านิวทนาการสูง และมีความเอวอ้วนของเนื้อปลาที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้ผู้บริโภคนิยมพืชมามากขึ้นเรื่อยๆ และที่สำคัญคือ ขณะนี้ยังไม่แพร่หลายในการทำอาหารทะเลเลี้ยงปลาบก ซึ่งแต่เดิมมันมีปลารสชาติจากลุ่มน้ำโขงได้เหมือนอย่างเคย ดังนั้นจึงนับเป็นจุดแข็งที่เกษตรกรไทยสามารถยึดเป็นแนวทางในการเพาะเลี้ยงเพื่อการส่งออกต่อไป

กฏเกณฑ์และLMs

เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงต้นทุนสินค้าโภค
ภัณฑ์จะเปลี่ยนแปลง 100 ตัว ต่อไร่ ให้
อาหารสัตว์ 2% ปริมาณปุ๋ยที่รวม 30%
ผลผลิตหญ้า 5% ปอที่เลี้ยงควรมีขนาด
ใหญ่และมีความลึกกว่าปอเลี้ยงปลาเนื้อ
ขาวมา คือขนาด 5-20 ไร่ ควบลึก 2-3
เมตร มีระบบท่อส่งน้ำและระบายน้ำเพื่อ
รักษาคุณภาพน้ำช่วยเป็นปลาปักเจริญ
เติบโตและเจริญพันธุ์ได้ดี

การผสมเทียมปลาเก๋เพื่อผู้ดูแลเพศ
เมียที่เลี้ยงใหม่ติดิน สลางรอผสมเทียมได้
วัยยอวัยมัน แต่ยังไม่อายุมากกว่า 5-10 ปี
และต้องอยู่ในช่วงฤดูวางไข่ (ตั้งแต่ปลาย
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ของทุกปีจึงจะ
เหมาะสม)

การร่นำ^๕เชื้อแช่แข็งเป็นภาวผลเสีย
มากรลดปัญหการขาดแคลนพ่อแม่
พันธุ์ ซึ่ง^๕ถานเชื้อสเปกมาลพันธุ์และกับ
รักษ้อย่างถูกวิธีสามารถ^๕ไ้^๕นาน
สำหรับการอนุบาลและเลี้ยงลูก
ถึง^๕เป็นตัวจนอายุ 1-3 วัน ให้^๕แดง

รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอาพันธ์ ควบคุมการรื้อนำเขื่อปลาน้ำ



ປະຊາທິປະໄຕ



အကယ်၍

ดูรายละเอียดบน ขนาด 100 ตารางเมตร ต่อตารางเมตร จะตั้งราคาขนาด 500-1,000 ตารางเมตร เราเราให้แถมสิ่งต่าง ๆ

มาเก็บค่าประกันและวีซ่าและตลาดตั้งอยู่ เนีย
ปลายอายุ 17-18 วัน ยื้อหาปลาจากเล็ก
ผสมลูกเข้าแมง จนปลายอายุ 30 วัน ไข่ปลา
อายุขนาดโตเต็มที่ยังอยู่ 60 วัน จะถึงปลา
ขนาด 3-5 นิ้ว ถ้าต้องการปลาน้ำเค็มเพื่อเอว
ช่วยเข้าบ่อขนาด 1-2 ไร่ และปล่อยตัว 5 ตัว
การเลี้ยงอาหารนั้นสำหรับปลาน้ำเค็มเก็บค่า
ส่วนหนึ่งคือ ปลาตัวขาว หากถึงเดือน วิ
ปลาในและศรทวยละก็อยู่ได้ 3-4 เดือน 5%
เป็นส่วนผสมที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงใน
การเลี้ยงอาหารเอง และเป็นอาหารประหยัด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายได้มาก

การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสปีชีส์ใหม่ เป็นแหล่งอาหารที่อุดมด้วยโปรตีนที่มีปริมาณสูงถึงร้อยละ 50-70 ของน้ำหนักแห้ง ซึ่งจะช่วยย่นระยะเวลาเจริญเติบโตและลดการเจริญพันธุ์ของปลาได้ดี สหพราย *Chlorella* sp. เป็นสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็กที่มีโปรตีนสูง ใช้ในการเลี้ยงไรแดงเพื่อหมักปลาสดกับกระดาก จากนั้นนำไปแปรรูปเพื่อใช้หมักเป็นอาหารเลี้ยงไรแดงเพื่อหมักปลาสดกับกระดากเพื่อการอนุบาลลูกปลาได้ดียิ่งขึ้น ทำให้ลดการปนเปื้อนของสาหร่ายจากโรงงานแปรรูปได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ 74.09% ของน้ำหนักแห้งประกอบด้วยโปรตีน 12.50% ไขมัน 10.19% และแฉะ 3.47%

และเกิน 3.47%

รศ.ดร.ภาณุรักษ์ศักดิ์ ภาณุวรา วัฒนธำมัญญกุล
ปลาน้ำจืดควมหลากหลายมากขึ้น เช่น
ก๊วยเตี๋ยปลา จุกจิ้ม ห่อหมก พอดผัด
และลัดเตี๋ยปลา ซึ่งทำทานนอกว่าร่อย
กว่าปลาแช่หมอน จึงอยากส่งเสริมให้ทาน
ปลาน้ำจืดเข้าครัวเรียนกับลูกกลับและ
เพิ่มพูนความรู้ปลาน้ำจืดกับสื่อวิทยุ

โดยทางคณะประมงแม่โจ้จะจัดให้
การฝึกอบรมนี้ระหว่าง วันที่ 10-12
กรกฎาคม 2551 พร้อมด้วยการนำศึกษา
ดูงานที่ "ธุรกิจร่ม" ของ *ศรีวัล* ไชยอินทร์
การ และ "เอ็น เอส แมงกอล ฟาร์ม

จำกัด" ของ *คุณศรีนันทน์* แก้วที่อำเภอ
บ้าน จันทบุรีจังหวัดปราจีน
บุรี จังหวัดบึงกาฬ
สน.งสอสามารถจะเชิญหรือจัดหา
องค์การตติยอันดับนักได้ที คณะ

เขตในโยมีการประชุมและรับพิจารณา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. (065) 873-470-2

Sign 1032